

# Grippe AH1N1 : Indications d'adressage à Jean Verdier

Uniquement les enfants nécessitant un prélèvement et/ou ayant une indication de traitement par TAMIFLU doivent être adressés à Jean Verdier

## Indications de prélèvements

- 1) patients présentant des signes de gravité
- 2) patients traités et présentant une aggravation clinique
- 3) En cas de cas groupés : 3 patients au sein d'une même collectivité (famille, classe, unité de travail...), voire à plus si les investigations le nécessitent (inutile de prélever tous les membres de la collectivité)
- 4) aux contacts bénéficiant d'une chimio-prophylaxie et développant des signes de grippe

## Indications de traitement

### 1) Syndrome grippal chez les enfants à risque d'une forme sévère ou dans la fratrie d'un enfant à risque

1. Anciens grands prématurés (<32 sem AG) voire très grands prématurés (<28 sem AG) et âgés <1 an.
2. Nouveau-nés prématurés avec une dysplasie bronchopulmonaire définie par une oxygéo-dépendance à 36 sem d'âge corrigé.
3. Nourrissons et enfants avec une insuffisance respiratoire chronique (antécédents d'hernie diaphragmatique, omphalocèle, myopathie, mucoviscidose, scoliose, etc...)
4. Nourrissons et enfants ayant une cardiopathie cyanogène ou une HTAP
5. Nourrissons et enfants immunodéprimés : congénital ou acquis (SIDA)
6. Nourrissons et enfants sous traitement immunodépresseur (corticoïdes, chimiothérapie)
7. Nourrissons et enfants drépanocytaires.

### 2) Enfants ayant une grippe avec signes de gravité

- Fréquence respiratoire (>...../min)\*
- Tirage intercostal
- Refus complet d'alimentation
- Pâleur voire cyanosé (lèvres bleutées)

\*Valeurs supérieures de la FR en fonction de l'âge

Age	1J-1sem	1sem-1m	1mois-1an	2-5 ans	6-12 ans	13-18 ans
FR haute	>50	>40	>34	>22	>18	>14